



Weide Erganzer

Specialfoder

Supplerende foder til heste og ponyer

Nar der grases meget, giver enggras normalt tilstrekkelige fedtoploselige vitaminer, men der er ofte mangel pa mineraler. For at kompensere for dette indeholder gresningstilskuddet kun mineraler og sporstoffer af hoj kvalitet uden yderligere vitaminer. Desuden er muslien rig pa essentielle fedtsyrer. Energileverandererne af byg- og majsflager samt marietidselolie har en stimulerende effekt pa hestens stofskifte, uden at proteinbalancen pavirkes. Solsikkefro tilforer strukturelt bundne vegetabiliske olier, lecithin og sekundare plantestoffer. For at understotte en kontrolleret fordojelse blev muslien opgraderet med et specielt rafiberkoncentrat. Dette stabiliserer fordojelseskanalen og gor fodemassen losere. Gresningstilskud indeholder kun lidt protein, da grasset har et hojt proteinindhold, isar i begyndelsen af gresningsperioden. Til dette velges energiindholdet, sa selv heste ved let til moderat arbejde ikke har et energiunderskud. Gresningstilskud er korn til alle heste, der bruger hele gresningssasonen ind i efteraret. Heste med tendens til gresmave bor kun have et begranset gresareal, sa det vandrige, fyldige gras erstattes med et mere koncentreret foder. Muslien er ogsa et godt valg til disse heste. Dette gresningstilskud understotter din hests velbefindende gennem hele gresningssasonen!

Et overblik over fordelene:

- For heste af alle racer som et supplement til enggras
- - Sikrer afbalancerede forhold ved sensibelt stofskifte
- - Yderligere rafiber for at stabilisere fordojelsen
- indeholder mineraler og sporstoffer af hoj kvalitet
- med de essentielle aminosyrer lysin og metionin

Fodringsanbefaling:

let til moderat arbejde: ca. 200 g - 400 g pr. 100 kg kropsvegt/dag. Kan ogsa bruges over vintermanederne, men derefter skal der tilfoyes et mineralfoder.

Sammensetning: 23,4 % Byg (flager), 19,2 % Majs (flager), 16,9 % Frugt(eble)pomace, torret, 8,5 % Majs (knust), 5,9 % Melasse af sukkerror, 5,5 % Lignocellulose, 3,8 % Alfalfaho (torret), 3,7 % Byg, 3,7 % Havreskalsklid, 1,5 % Solsikkekerner, 1,3 % Hakket johannesbrod, 1,1 % Dicalciumfosfat, 1,1 % Calciumcarbonat, 1,0 % Marietidselolie, 0,9 % Natriumchlorid, 0,8 % Vindruerkernemel, 0,6 % Magnesiumoxid, 0,4 % Gulerodspomace, torret, 0,1 % Rodbeder (torret)

ford. Raprotein (vRp): 48,5 g/kg

fordøjelig. energi (MJ DE): 10,7 MJ DE/kg

Analytiske komponenter og indholdsniveauer: 8,00 % Raprotein, 4,30 % Rafedt, 11,80 % Rafiber, 6,80 % Raske, 0,85 % Calcium, 0,40 % Fosfor, 0,40 % Natrium, 0,40 % Magnesium, 0,30 % Lysin, 0,25 % Metionin, 31,30 % Styrke, 6,60 % Sukker

Tilsetningsstoffer pr. kg: 250,00 mg Zinkoxid (3b603) ^{NA}, 25,00 mg Kobber (3b405) (kobber (II) sulfat, pentahydrat) ^{NA}, 1,10 mg Selen (3b801) (natriumselenit) ^{NA}, 2,00 mg Vandfri calciumiodat (3b202) ^{NA}, 20,00 mg Kobber (3b406) kobber (II) - aminosyrechelate, hydrat ^{NA}, 30,00 mg Mangan (3b504) aminosyre manganchelate, hydrat ^{NA}, 45,00 mg Glycin-zinkchelathydrate (3b607) ^{NA}, 220,00 mg L-lysin-





monohydrochlorid, techn. ren (3c322) ^{NA}, 1125,00 mg DL-metionin, techn. ren (3c301)
NA

NA = Næringsstoffer
ZA = Zootekniske tilsætningsstoffer
TA = Teknologiske tilsætningsstoffer
SA = Sensory additives

